¿Cómo cuidar el implante subdérmico?

- Mantener la herida seca y vendada por 7 días.
- Evite levantar objetos pesados, trapear, recibir golpes o lavar a mano durante una semana.
- No tomar aspirina, alkaseltzer, sal de frutas en los 3 días posteriores al procedimiento.

¿Cuáles son los signos de alarma?

- Se debe consultar a urgencias si la herida no está completamente cerrada al retirar la gasa.
- Si presenta enrojecimiento, calor o salida de pus por la herida.
- Si presenta expulsión del implante.

www.google.com/search?q=implante%20subdermico%20mal%20colocado&tbm=isch&hl=es419&rlz=1C1NHXL_esCO1043CO1043&sa=X&ved=0CCYQtI8BKANqFwoTCKCuq5q2gf0CFQAAAAAdAAAAABAI&biw=1349&bih=657#imgrc=iAMbfxwriREHRM

A tener en cuenta para solicitar citas de control:

- Pedir cita de control al mes.
- Si ha presentado cambios en el sangrado consultar.
- Si el peso corporal ha cambiado de manera descontrolada
- Si ha presentado algún cambio en su estado de ánimo.

Manuel Uribe Angel
E.S.E HOSPITAL
Vinculados con la Vida!