

PRECACIONES ESPECÍFICAS CON LOS MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPÉUTICOS ORALES

Medicamento	Recomendaciones	Indicación	Efectos secundarios
Capecitabine (Xeloda*)	Tomar 30 minutos después de los alimentos sin triturar	Colon, recto, mama y vía biliar	Hinchazón y dolor en pies y manos, diarrea, inflamación en boca y labios, incremento de Bilirrubinas, náuseas y vómito, anorexia y fatiga
Erlotinib (Tarceva*)	Tomar con el estómago vacío	Pulmón y páncreas	Alteraciones en la piel, diarrea, fatiga, tos, náuseas y vómito
Dasatinib (Sprycel)	Evitar el jugo de uva y los ácidos ya que inactivan el medicamento	Linfoma de células de manto y linfocítica aguda	Retención de líquidos, disminución de la actividad de la médula ósea, alteraciones en la piel y diarrea
Gefitinib (Iressa*)	Realizar electrocardiograma previo al tratamiento y cada 3 meses durante su uso. Consumir con o sin alimentos	Pulmón avanzado o con metástasis	Diarrea, acné, náuseas y vómito, picazón e irritación en los ojos
Imatinib (Gleevec*)	Administrar con abundante agua durante las comidas	Linfoma de células de manto y gastrointestinal	Goteos sanguíneos bajos, Náuseas y vómito, inflamación, calambres musculares y alteraciones en la piel.
Lapatinib (Tykerb*)	Evitar el jugo de uva	Mama	Hinchazón y dolor en pies y manos, diarrea, náuseas, vómito y anemia.

Medicamento	Recomendaciones	Indicación	Efectos secundarios
Sorafenib (Nexavar*)	Consumir con el estómago vacío	Cáncer renal, de hígado y tiroides	Hinchazón y dolor en pies y manos, alteraciones en la piel, diarrea y fatiga.
Nilotinib (Tasigna*)	Tomar con el estómago vacío (1 hora antes o dos horas después de las comidas) y evitar el consumo de Pomelo	Linfoma de células de manto	Disminución de la actividad de la médula ósea, salpullido, dolor de cabeza, diarrea, náuseas y vómito.
Sunitinib (Sutent*)	Evitar el jugo de uva y pomelo	Cáncer renal, gastrointestinal y tumor neuroendocrino de páncreas avanzado	Fatiga, diarrea, náuseas y vómito, goteos sanguíneos bajos, hipertensión, acidez y alteración del gusto.
Vemurafenib (Zelbo-raf*)	Evitar el jugo de uva y calambombo	Cáncer de piel no resecable o metastásico	Dolores articulares, fatiga, alteraciones en la piel, sensibilidad al sol, pérdida de cabello y náuseas.
Anastrozol (Arimidex*)	Consumir en el mismo horario con o sin alimentos	Mama en mujeres posmenopáusicas	Sensación repentina de calor, náuseas, fatiga y debilidad, dolor en los huesos y tos.
Letrozole (Femara*)	Consumir en el mismo horario con o sin alimentos	Mama avanzado o metastásico.	Sensación repentina de calor, náuseas, fatiga y debilidad, dolor en los huesos y tos.
Bicalutamida (Casodex*)	Consumir en el mismo horario antes o después de las comidas	Cáncer de próstata avanzado.	Sofoco, agrandamiento anormal de las glándulas mamarias masculinas, dolor en el seno, disminución del apetito sexual e impotencia.
Tamoxifeno (Nonvaldex*)	Consumir en el mismo horario con o sin alimentos	Mama y ovario.	Sensación repentina de calor, secreciones vaginales, hinchazón y pérdida del deseo sexual.

Medicamento	Recomendaciones	Indicación	Efectos secundarios
Everolimus (Afinitor*)	Consumir en el mismo horario antes o después de las comidas (no masticar ni partir las pastillas)	Cáncer renal y de mama avanzado y tumores neuroendocrinos pancreáticos avanzados	Anemia, exceso de triglicéridos en la sangre, aumento de creatinina, inflamación gastrointestinal, debilidad y diarrea.
Acetato de abiraterona (Zytiga*)	Consumir en el mismo horario con o sin alimentos	Cáncer de próstata metastásico	Retención de líquidos, hinchazón en pies y manos, diarrea, dolor muscular, aumento de triglicéridos y enzimas hepáticas.
Ácido Transretinoico (Vesanoid*)	Consumir con abundante agua con las comidas	Leucemia promielocítica aguda.	Síntomas similares a gripa, inflamación en pies y tobillos y dolor abdominal.
Talidomida	Tomar una hora antes de acostarse	Mieloma múltiple.	Disminuye la función de los nervios, alteraciones en la piel, picazón y enrojecimiento en tronco, espalda, brazos y piernas; dificultad para hacer deposiciones, debilidad, sueño y confusión.
Lenalidomida (Revlimid*)	No romper, masticar o abrir las cápsulas	Síndromes mielodisplásicos.	Disminución de la actividad en la médula ósea, diarrea, salpullido y cansancio.
Hidroxiurea (Hydrea, Droxia, Mylocel)	Puede disolverse en agua	Linfoma de células de manto, Trombocitosis esencial, cáncer de piel, ovario refractario, cabeza y cuello.	Recuento bajo de células sanguíneas, náuseas y vómito, diarrea, llagas en la boca, engrosamiento de las uñas y decoloración de la piel.
Melfalan (Alkeran*)	Tomar con el estómago vacío (1 hora antes o dos horas después de las comidas)	Mieloma múltiple, cáncer ovario y mama, neuroblastoma y Rabdomiosarcoma.	Disminución de la actividad en la médula ósea, diarrea, alteración renal y ritmo cardíaco, pérdida de cabello Y llagas en la boca.
Metotrexate	No consumir suplementos de ácido fólico durante el tratamiento	Cáncer de mama, cabeza, cuello, estómago y esófago, leucemia linfocítica aguda, sarcomas, Linfoma no Hodgkin y cutáneo de células T y tumor trofoblástico.	Disminución de la actividad en la médula ósea, náuseas y vómito, pérdida de apetito, llagas en la boca, toxicidad en riñón y pérdida de cabello.

Medicamento	Recomendaciones	Indicación	Efectos secundarios
Mercaptopurina (Purinethol*)	Consumir en el mismo horario con el estómago vacío.	Leucemia linfocítica aguda.	Disminución de la actividad en la médula ósea, toxicidad en hígado, náuseas y vómito, oscurecimiento, resequedad y picazón en la piel.
Ruxolitinib	Consumir en el mismo horario con o sin alimentos.	Enfermedad de Ads, esplenomegalia, mielofibrosis primaria y secundaria a policitemia vera o trombocitopenia esencial.	Disminución de la actividad en la médula ósea, aumento de peso, enzimas y colesterol en sangre, mareo y dolor de cabeza.